

Thuốc Misoprostol trong việc phá thai thường sử dụng

Thuốc Misoprostol Đang có công dụng giống Prostaglandin E1, Ngoài chức năng là bảo vệ niêm mạc dạ dày, ức chế dịch tiết acid dạ dày, thuốc còn Gây nên kích thích khả năng tình dục tử cung thắt bóp Nên được Áp dụng Rất nhiều trong sản khoa.

công dụng hàng đầu của thuốc Misoprostol

Thuốc Misoprostol đóng trách nhiệm Quan trọng trong sản khoa và Việc đó được khẳng định qua Những công dụng hàng đầu như sau:

- hỗ trợ Quá trình có con của phụ nữ: thúc đẻ, làm cho giãn dạ con, khởi phát cơn đổi sang dạ;
- Misoprostol còn được Dùng Nhằm Hạn chế cũng như giải quyết Di chứng băng huyết Sau đây sinh. Mặt khác thuốc cũng có khả năng được ứng dụng trong Những tình huống phá thai bằng thuốc, chấm dứt thời kỳ thai nghén trong 3 tháng cuối của thời kỳ mang thai đối với Những trường hợp thai lưu, thai dị tật;
- tác dụng khác: Tránh Hệ quả Nhiễm trùng loét dạ dày do phản ứng phụ của Các thuốc kháng Nhiễm trùng không steroid (nhóm NSAIDs như naproxen, ibuprofen, aspirin), đặc biệt là trong Những trường hợp Bệnh nhân Từng Mắc Viêm loét. Khi được đưa vào cơ thể, Misoprostol sẽ Giúp cho khiến cho Hạn chế số lượng axit Đang có trong dịch vị, Thông qua đó bảo vệ lớp mô trong niêm mạc dạ dày.

Thuốc Misoprostol có thể dẫn đến Các tác dụng phụ như sau:

- Cảm giác đau đầu, chóng mặt, lệt huyết áp;
- Cảm giác đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, Xuất huyết âm đạo;

- Đầy hơi, Đau bụng, táo bón, buồn nôn, Khó khăn tiêu, tiêu chảy
Khoảng nhẹ tới nặng;
- Nhiễm trùng tụy;
- mệt mỏi, cơ thể suy nhược, căn bệnh thần kinh ngoại biên, trầm cảm.

2. Thuốc Misoprostol Dùng theo Phương hướng nào?

2.1. Sử dụng Misoprostol giúp mục đích chuyển dạ

Theo khuyến rằg của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Đã có 2 Để ý Khi Dùng Misoprostol trong trường hợp khởi phát đổi thành dạ:

- Áp dụng cho Các chị em nữ giới thai kỳ tiến triển đầy đủ tháng hay Chưa có tiền Chứng mổ bắt thai;
- Dùng Nhằm chấm dứt thời kỳ mang thai đối với Các tình huống thai chết lưu trong Tâm 3 tháng cuối thai kỳ hoặc Bào thai Bị dị tật bẩm sinh.

Trong cả 2 khuyến rằg nêu Trên đây, liều Dùng đượg quy chuẩn là 25mcg Misoprostol đườg Uống Áp dụng mỗi 2 giờ, còn với đườg đặt "cô bé" thì là 25mcg mỗi 6 giờ.

2.2. Sử dụng Misoprostol cho mục đích Phòng tránh băng huyết Như sau sinh

Vấn đề Dùng Oxytocin theo đườg tĩnh mạch Để Khắc phục Biến chứng băng huyết Sau đây sinh đượg giúp là Nhẹ nhàng hơn so đối với Misoprostol đườg Dùng. Tuy nhiên với trường hợp Oxytocin không sẵn Có thì Kỹ thuật Misoprostol sẽ đượg chỉ định Thay Để khiến cho co hồi tử cung, Giúp Ngăn chặn Hệ lụy Nguy hiểm này. Lúc này liều Áp dụng Misoprostol đườg Dùng sẽ là 600mcg.

Tuyệt nhiên Misoprostol còn là Cách Giúp cho khắc phục Cấp độ băng huyết Như sau sinh Lúc mà Oxytocin không đạt kết quả.

Nếu Cảm nhận Trạng thái băng huyết Sau sinh không thuyên Giảm chế Khi đã dùng thuốc, nguy hiểm nhất còn trở Cần Nguy hại hơn thì người trong gia đình sản phụ Phải thông báo Nhanh chóng giúp Bác sĩ tư vấn Để được cấp cứu sớm.

2.3. Dùng Misoprostol giúp mục đích phá thai

- tại trường hợp phá thai sau 9 tuần tuổi: Sử dụng Mifepristone đối với một số lượng Khoảng 200 mg, Như sau Từ 24 - Hai ngày tiếp tục Dùng thêm 800 mcg Misoprostol theo đường ngậm sau lưỡi hoặc ngậm áp má;
- đối với thai Khoảng 9 - 12 tuần: Uống Mifepristone đối với liều lượng 200 mg, Như sau 36 - 48 tiếng Áp dụng tiếp 800mcg Misoprostol đặt "cô bé", tiếp theo mỗi 3 giờ, ngậm Misoprostol sau lưỡi với liều 400 mcg (dùng tối đa là 5 liều);
- tại Bào thai Dưới đây 12 tuần tuổi: ban đầu Sử dụng 200 mg Mifepristone, 36 - Hai ngày tiếp theo Dùng thêm 800 mcg Misoprostol theo đường đặt âm hộ, mỗi 3 giờ kế tiếp đặt 400 mcg Misoprostol dưới lưỡi (tối đa 5 liều) giúp tới Khi sảy thai.
- Thủ tục chuẩn bị phá thai ngoại khoa: trước Khi Thực hiện tiểu phẫu bỏ thai Chuyên gia chuyên khoa có nguy cơ Dùng Misoprostol hay que nong ống cổ tử cung Nhằm làm cho giãn nở cổ tử cung. Với chỉ dẫn Sử dụng Misoprostol có nguy cơ Sử dụng duy nhất một liều 400mcg, hoặc đặt "cô bé" 3 giờ hay ngậm sau lưỡi 2 giờ trước Khi Tiến hành thủ thuật bỏ thai.

3. Chống chỉ định Sử dụng Misoprostol giúp Những trường hợp nào?

Thuốc Misoprostol không nên chỉ dẫn Dùng cho Những Đối tượng sau:

- Người có bệnh Mắc dị ứng hoặc nhạy cảm đối với bất kỳ Thành phần nào của thuốc;

- Tuyệt nhiên không Dùng Misoprostol cho bạn nữ Có mang mà Không có mong muốn bỏ thai, bởi do thuốc sẽ Gây Tác hại cho Thai nhi, đặc biệt là dẫn tới sảy thai. Mặt khác Đang có trường hợp Sử dụng Misoprostol Gây ra lưu thai, dị dạng bẩm sinh, sảy thai. Do vậy thuốc Phải được Sử dụng theo Phương hướng dẫn hay chỉ định Rõ rệt của Bác sĩ tư vấn chuyên khoa;
- Thận trọng Dùng Misoprostol cho Các tình huống Bị Các căn bệnh về tim mạch, bệnh mao mạch não, Nhiễm trùng ruột, hội chứng ruột kích thích ham muốn, tiêu chảy nặng nề và Các Vương mắc Khác về đường ruột;
- không được Dùng Misoprostol giúp Những trường hợp phụ nữ mang thai mang đa thai, Nguy cơ cao Bị mắc vỡ tử cung vì Có sẹo mổ Khoảng lần mổ trước;
- Misoprostol không dành giúp con gái đang giúp con bú vì Thành phần của thuốc có khả năng đào thải đáng nhập sữa mẹ, khiến trẻ dễ Mắc tiêu chảy;
- Misoprostol không dành cho nữ giới đang trong tuổi có con hoặc chị em nữ giới Đã có dự định Có thai, trừ tình huống Người bệnh đang Sử dụng nhóm thuốc chống Viêm nhiễm không steroid (NSAIDs) hay có nguy cơ Bị Biến chứng Viêm loét dạ dày do tác dụng phụ của nhóm thuốc này.

Đặc biệt không Sử dụng Misoprostol giúp chị em phụ nữ Có mang mà Chưa có chỉ định Từ Bác sĩ tư vấn

4. Biện pháp xử lý Khi quên một liều hoặc Sử dụng quá liều thuốc Misoprostol

Nếu như Người mắc bệnh quên Sử dụng 1 liều Misoprostol, hãy Dùng Tức thì Lúc vừa nhớ ra trong Thời gian sớm nhất. Nhưng mà Nếu Thời gian này đã từng rất gần với liều Áp dụng thuốc kế tiếp thì hãy Áp dụng theo đúng kế hoạch, không Uống bù gấp Cặp liều thuốc.

Nếu Người mang bệnh Sử dụng quá liều Misoprostol thì người sẽ Nổi Những triệu chứng như sau: thụt giật, run rẩy, an thần, sốt, Khó thở, tiêu chảy, Đau bụng, hạ huyết áp, đánh trống ngực, tim đập chậm. Trong tình huống này hãy gọi điện Tức khắc với Bác sĩ hoặc tới Khu vực y tế Nhằm được Kiểm tra và xử lý đúng Phương hướng.

- [phòng khám 11 thái hà phòng khám](#)
- [bệnh viện nam khoa hà nội](#)

[Top 10 địa chỉ khám chữa yếu sinh lý ở đâu tốt nhất tại Hà Nội chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất tại Hà Nội cắt bao quy đầu ở đâu an toàn cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền giá cắt bao quy đầu ở bệnh viện bình dân chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất hà nội chữa bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền đại tiện ra máu khám ở đâu khám phụ khoa ở hà nội chỗ nào tốt khám phụ khoa giá bao nhiêu cách phá thai an toàn nhất giá hút thai phá thai ở đâu an toàn địa chỉ chữa sùi mào gà khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền sùi mào gà nam giới tri sui mao ga chữa bệnh lậu ở hà nội chữa hôi nách ở đâu tốt đau tinh hoàn khám ở đâu](#)

Mặt khác không nên Nhằm thuốc gần đối với Tầm với của trẻ. Misoprostol Cần được bảo quản tại Những Địa điểm khô ráo, thoáng mát Đã có nhiệt cấp độ dưới 30 độ C, không Sờ trực tiếp đối với ánh sáng.

Bỏ thai ba tháng đầu bằng thuốc được Tiến hành cho ai?

Hình thức này được Tiến hành cho Những phụ nữ:

- Mang bầu 7 tuần tuổi trở xuống (tính Từ hôm trước hết của kỳ kinh cuối cùng).
- Muốn kết thúc có bầu.

Giải pháp này Đã có an toàn và Nhẹ nhàng không ?

- Phá thai nội khoa là Phương thức Áp dụng thuốc Nhằm chấm dứt có thai 1 Phương hướng an toàn cũng như tin cậy.
- Phương án này an toàn Khi cơ thể cung cấp dịch vụ là Những cán bộ y tế đã được tu dưỡng cũng như Có đủ Kỹ lưỡng năng Tiến hành Hướng bỏ thai này.
- Phá thai bằng cách uống thuốc Đã có Nhanh chóng tới 96-99%.

Phương hướng này diễn ra thế nào?

- Nhân viên y tế sẽ Tiến hành Khám kỹ càng khung chậu.

- Thành viên y tế sẽ hỏi bạn Mệt vài Câu hỏi về sức khoẻ của bạn, gì? áp? Quá trình b? thai và T? v?n cho b?n v? Các Cách Ki?m ch? thai.

- B?n Ph?i ký truy c?p 1 b?n cam k?t b? thai.

- R?i sau ó nhân viên y tế sẽ ??a cho b?n m?t viên thu?c tên Mifepristone (Mifestad@200) ?? S? d?ng ? Khu v?c. Mifepristone (Mifestad@200) s? làm thai b?n ngưng ti?n tri?n.

- Có kh? n?ng b?n s? c?m Th?y v?n bình th??ng Khi ?ã Dùng viên thu?c này tuy nhiên c?ng có th? G?p Ch?y máu âm h?.

- B?n s? ra v? Khi ?ã Dùng viên thu?c này.

- B?n s? S? d?ng Ch?ng thu?c ti?p theo là Misoprostol: Dùng 2 viên Misoprostol Khi ?ã Dùng Mifepristone 2 ngày. B?n có kh? n?ng quay l?i Khu v?c y tế ?? S? d?ng Misoprostol.

- Th??ng thì trong T?m 30 phút t?i 4 gi? Sau khi U?ng Misoprostol, b?n s? C?m giác ?au b?ng, Ra máu Ph?n nhi?u và Xu?t huy?t c?c Khi thai ???c ??y ra Phía ngoài.

- ?a s? ?àn bà Ra máu nh? kinh nguy?t trong C? 10 hôm nh?c Kho?ng Khi S? d?ng thu?c, tuy nhiên M?t vài ít ch? em có th? Ch?y máu nh? kéo dài h?n m?t tháng.

Đang có phản ứng phụ Khác lạ không?

- B?n có nguy c? Th?y bu?n nôn, tiêu ch?y ho?c nôn m?a trong quá trình s?y thai. Nh?ng d?u hi?u này Gây nên Khó b?n tuy nhiên không Nên là V??ng m?c b?t th??ng và s? qua ?i ??n trong Th?i gian ng?n, không C?n ph?i Ch?a tr? ??c bi?t gì.

- B?n s? ???c kê ??n thu?c Ki?m ch? ?au, nh? Paracetamol hay Ibuprofen ?? Ki?m ch? c?n C?m giác ?au b?ng.

- B?n c?ng có kh? n?ng Áp d?ng chai n??c ?m hay kh?n ?m ?? ch??m b?ng.

- B?n có nguy c? G?p ?au ??n ??u hay hoa m?t Sau khi S? d?ng Misoprostol. Hãy U?ng R?t nhi?u n??c ho?c n??c trái cây - Không S? d?ng cà phê hay r??u và U?ng thu?c Gi?m C?m giác ?au N?u Quan tr?ng.

- M?t s? n? gi?i B? s?t trong vài ba gi?, th?nh tho?ng ?i kèm ?n l?nh. Bi?u hi?n này s? nhanh chóng qua ?i ??n hay không Nguy h?i.

Tôi Phải làm gì khi Thực hiện Nguyên lý này?

- Thay thế băng Tắm Luôn như trong kỳ kinh bình thường cho đến Lúc hết Ra máu.

- Bạn có khả năng Tắm bình thường.

- Bạn không Cần ăn kiêng bất kỳ Kiểu Đồ ăn nào.

Nếu Biện pháp này bất thành thì sao?

- Bào thai có th? B? m?c khuy?t t?t N?u nh? Bào thai ti?p t?c ti?n tri?n. Do ó, Khi b?n ?ã t?ng S? d?ng Mifepristone, b?n ch?a th? gi? gin ???c thai n?a.

- N?u phá thai n?i khoa b?t thành, Ph?i Th?c thi hút thai.

Có nguy cơ diễn ra hậu quả không?

Phá thai ba tháng đầu bằng thuốc là tiểu phẫu an toàn hơn Đa số so đối với Nguyên tắc nạo bằng thìa, tuy nhiên vẫn Đang có một số trường hợp nhỏ Những tai biến có khả năng diễn ra.

Những tai biến nào có thể xảy ra?

Vô cùng hiếm Khi khách hàng Thấy hậu quả hay Biến chứng như:

- Chảy máu quá nhiều Cần phải nạo phá thai với Nguyên lý hút chân không.
- Nhiễm trùng Cần phải Dùng thuốc kháng sinh.
- Chảy máu quá nhiều Gây ra mỗi mệt hay sây sẩm mặt mày, Phải tiếp máu.

Lúc nào tôi Cần quay lại Khu vực y tế?

Nếu như bạn thấy:

- Cảm giác đau bụng liên tiếp Dưới đây Tình trạng Xuất huyết đầu tiên.
- Ra máu âm đạo quá nhiều(mỗi giờ thấm hết 2 băng Tắm rửa dầy trong 2 giờ liền).
- Sốt 380C trở lên và lâu ngày Vừa rồi 24 giờ Khi đã Uống Misoprostol.
- Không Chảy máu trong Vòng một ngày Khi đã Uống thuốc Misoprostol.

(Chú ý: có nguy cơ Xuất huyết kéo dài trong vài tuần nhưng Phải Kiểm chế dần về lượng)

- Quay lại Ki?m tra th?m khám trong T?m 2 tu?n Nh?m kh?ng ??nh t?ng s?y thai v?nh vi?n. L?n tái Ki?m tra này là vô Cùng C?n thi?t.

Tôi Cần làm thế nào Nhằm Ngăn chặn Có chửa Ngoài ý muốn?

Phương pháp phá thai bằng thuốc sẽ chấm dứt có bầu lần này tuy nhiên bạn có nguy cơ Mang thai trong Vòng 2 tuần Sau đó Nếu như Đã có Quan hệ tình dục cũng như không Áp dụng Biện pháp Ngăn chặn thai. Vì vậy, bạn Cần phải Dùng 1 Cách Ngăn ngừa thai hiện đại Nhằm Để phòng Có thai Ngoài ý muốn.

Các Biện pháp Phòng ngừa thai hiện nay nào là phổ biến?

Nhân viên y tế sẽ chia sẻ thông tin, Giúp bạn Chọn hay Phương pháp dẫn bạn Cách thức Áp dụng 1 Giải pháp Để phòng thai khoa học.