

# Phá thai bằng thuốc có ảnh hưởng gì không? Những điều cần lưu ý

## Phá thai bằng thuốc có ảnh hưởng gì không? Những điều cần lưu ý

Phá thai nội khoa là cách kết thúc thời kỳ mang thai được rất nhiều cơ thể chọn khi có bầu ngoài ý muốn. Song, vấn đề tự tiện sử dụng thuốc bỏ thai ở nhà không bằng kiểm tra và chỉ định của chuyên gia y học có thể gây ra rất nhiều hậu quả nguy hại tới tính mạng, cũng như tính mạng có con của cơ thể chị em phụ nữ.

Lưu ý: những thông tin cung cấp trong bài văn bài viết này chỉ bị đặc tính vận dụng, không thay cho vấn đề xét nghiệm, phỏng đoán cũng như chỉ dẫn điều trị y học. Phái đẹp tuyệt đối không tự ý dùng thuốc bỏ thai tại nhà. Cần phải thăm khám trực tiếp, Nói chuyện với chuyên gia phụ khoa để được chỉ định phác đồ hợp lý.

## Phá thai bằng thuốc là gì?

Phá thai bằng cách uống thuốc là chấm dứt một thời kỳ mang thai bằng giải pháp bằng thuốc, nghĩa là sử dụng thuốc nhằm dẫn tới sảy thai. Chuyên gia Hồ Thị Khánh Quyên cho thấy, theo quy ước phá thai bằng thuốc được coi là thành tựu khi sảy thai tận gốc mà không nên can thiệp bất cứ thủ thuật nào đăng nhập buồng dạ con, nhờ vậy suy giảm được nguy cơ viêm nhiễm cũng như thủng tử cung. (1)

## Cơ chế vận động của thuốc bỏ thai

Thì có 2 dạng thuốc được lấy trong phác đồ phá thai bằng thuốc, đó là: Mifepristone 200mg( Mifestad 200mg), Misoprostol 200mcg.

Mifepristone 200mg liệu có công dụng gây ngừng quá trình tiến triển của bào thai. Misoprostol có tác dụng dẫn tới thắt bóp dạ con để đẩy phôi thai ra thuyên giảm tử cung.

Rất nhiều chị em phụ nữ lầm cho rằng thuốc phá thai là thuốc tránh thai cấp tốc, uống 10-20 viên thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ cộng dồn đầy đủ

liều sẽ có công dụng như thuốc bỏ thai. Bác sĩ Khánh Quyên cung cấp, thuốc Mifestad 10mg là thuốc phòng tránh thai cấp bách và thuốc Mifestad 200mg là thuốc được lấy trong phác đồ phá thai nội khoa. Chính vì vậy không được sử dụng thuốc tránh thai cấp bách để phá thai.

- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868635>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868633>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868624>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868614>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868610>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868605>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868608>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868576>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868572>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/867613>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868341>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868349>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868359>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868367>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868385>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868496>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868517>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868531>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868551>
- <https://suckhoe24gio.creatorlink.net/forum/view/868548>

“Thuốc tránh thai cấp tốc được tạo ra nhằm ngừa thai khẩn cấp, không được khảo sát cộng dồn liều lượng nhằm liệu có chức năng. Nếu như dùng quá liều thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ có nguy cơ gặp các tác dụng phụ như sốt, buồn nôn, ớn lạnh, đi tả, rét run... Trong trường hợp có chức năng bỏ thai Đến chẳng nữa cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ hậu quả bởi không được quan sát y khoa”, bác sĩ Khánh Quyên nhấn mạnh.

## **Tại sao cần lấy thuốc bỏ thai?**

Trong tình huống buộc kết thúc thai kỳ, phá thai bằng thuốc được ưu tiên lựa chọn bởi đây là cách được nhận xét sử dụng biện pháp an toàn cùng với nhanh chóng. Quy trình làm nhanh chọn lựa, số trường hợp thành quả lớn, chị em phụ nữ không cần nằm viện hay lấy các loại thuốc gây mê, dẫn đến tê. Tuyệt đối, Nếu mà uống thuốc bỏ thai thành tựu, nữ không cần phải can thiệp bất cứ một thủ thuật nào trong lòng tử cung, nhờ vậy hạn chế được các nguy cơ nhiễm trùng hoặc thương tổn lòng tử cung. (2)

Hạn chế của giải pháp này là chị em cần phải tái khám không ít lần nhằm thăm khám hiện tượng ra thai. Phụ nữ có nguy cơ bị đau bụng hoặc ra huyết âm đạo kéo dài hơn so đối với các biện pháp khác biệt. Nếu như bỏ thai bằng thuốc thất bại, chị em nhất thiết can thiệp thủ thuật nhằm sử dụng thai ra phía ngoài. Mặt khác, không phải tình huống nào cũng có khả năng dùng phương pháp này.

## **Chỉ dẫn sử dụng thuốc bỏ thai trong trường hợp nào?**

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên cho thấy, bỏ thai vì việc sử dụng thuốc thường được ưu tiên chỉ định trong một số tình huống như mang thai ngoài ý định (bị cưỡng hiếp, hai vợ chồng lấy phương pháp tránh thai không hiệu quả...), hoặc người mẹ mang chứng bệnh không thể mang thai, hay thai nhi liệu có chứng bệnh. (3)

Độ tuổi thai được chỉ định sử dụng thuốc phá thai là khoảng tầm 4-7 tuần (tính theo số ngày hoặc số tuần Khoảng ngày trước hết của kỳ kinh cuối cùng tới khi ý muốn bỏ thai hoặc theo siêu âm). Nhưng, ở tuổi thai không nhỏ hơn vẫn có khả năng lấy nhưng mà số trường hợp thành tựu không cao, hoặc bắt buộc cần phải liệu có phối hợp can thiệp tiểu phẫu mới kết luận tỷ lệ thành tựu nhiều hơn.

Cần chú ý, thuốc phòng tránh thai được khuyến cáo chống chỉ định kết luận những trường hợp sau:

- Người nhiễm bệnh lý tim mạch như hẹp van hai lá, có tiền sử tắc mạch hoặc bị tắc mạch;
- Người liệu có chứng bệnh tuyến thượng thận hay biến đổi đông máu;
- Người mắc mất máu ở cấp độ bình quân hoặc nặng;
- Cơ thể dị ứng với các đối tượng thì có trong thuốc phá thai.

## Một số kiểu thuốc bỏ thai thường thấy

Thực tế hiện nay thì có hai dạng thuốc phá thai được kết hợp sử dụng nhằm kết thúc thai kỳ là Mifestad và Misoprostol. Hai kiểu thuốc này đã được Cục Quản lý món ăn và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration – FDA) ưng chuẩn nhằm kết thúc thời kỳ thai nghén.

- Mifestad: Là loại thuốc được dùng trước tiên đối với công dụng khiến cho thai ngưng phát triển, Bên cạnh đó giúp cho thai bong ra khỏi lòng tử cung nhanh hơn.
- Misoprostol: loại thuốc được sử dụng dưới lúc uống Mifestad tầm khoảng hai ngày. Thuốc thì có tác dụng gây ra thụt thắt dạ con cùng với đẩy mô thai ra ngoài trong vòng một ngày Rồi.

## Hiệu quả của thuốc bỏ thai

Hiệu của của biện pháp đình chỉ thời kỳ mang thai bằng thuốc tùy thuộc vào khoảng thời gian mang bầu (tuổi thai) khi dùng thuốc. Khảo sát số trường hợp thành công theo độ tuổi thai cho hiệu quả như sau:

- Tuổi thai 8 tuần trở xuống thì có số trường hợp thành công là 94-98%, có nghĩa là cứ 100 cơ thể dùng thuốc phá thai sẽ có khoảng tầm 94-98 cơ thể ra thai cùng với 2-6 người không ra thai;
- Độ tuổi thai 8-9 tuần thì có số trường hợp thành quả là 94-96%;
- Độ tuổi thai 9-10 tuần có số trường hợp thành tựu là 91-93%;
- Độ tuổi thai 10-11 tuần có số trường hợp thành tựu là 87%.

“Trong những trường hợp sử dụng thuốc đình chỉ thời kỳ thai nghén song không ra thai, phái đẹp sẽ được siêu âm kiểm tra. Nếu thai hiện đang trong dạ con sẽ can thiệp hút thai ra ngoài để vệ sinh tử cung”, bác sĩ Khánh Quyên cho biết.

## Nên sắp các gì lúc uống thuốc phá thai?

Trước lúc làm phá thai bằng cách uống thuốc, nữ cần phải sắp một số điều sau: (4)

- Kiểm tra sức khỏe nhằm được đánh giá hiện tượng tính mệnh tổng thể thì có đầy đủ cơ hội làm biện pháp hay không, loại trừ các trường hợp chống chỉ định; định vị độ tuổi bào thai cùng với hiện tượng thai nhi nằm trong hay bên ngoài dạ con. Bên cạnh đó, nữ sẽ được bác sĩ trả lời cận kề phác đồ tiến hành, những biến chứng có nguy cơ xảy ra và lưu ý dưới khi sử dụng thuốc bỏ thai.
- Sắp tính mạng tốt với giải pháp ngồi nghỉ khoa học, liệu có chế độ ăn uống phù hợp, cung cấp toàn bộ dinh dưỡng, nhất là món ăn giàu sắt vì dưới phá thai chị em thường hay mắc thiếu máu.
- Sắp tâm sinh lý tốt, hạn chế lo lắng, lo âu quá độ. Tốt hơn hết nên liệu có người thân trong nhà đi cùng để giúp sức tâm sinh lý, và chăm sóc chị em dưới khi phá thai.

## **Phác đồ làm bỏ thai bằng thuốc**

Phác đồ chấm dứt thai bằng thuốc đang được tiến hành ở trọng điểm sản phụ khoa, cơ sở y tế Tâm Anh TP.HCM như sau:

- Lúc có quyết định bỏ thai, nữ đến thăm khám ở trọng điểm nhằm được bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa hỏi thăm bệnh sử, tiền sử, quan sát có bệnh lý chống chỉ dẫn hay không. Nữ được xét nghiệm tổng thể, kiểm tra sản phụ khoa, siêu thanh xét nghiệm thai nhi bao nhiêu tuần, thì có bao nhiêu thai trong buồng dạ con cùng với vị trí của thai.
- Lúc liệu có kết trái siêu âm, chuyên gia sẽ giải đáp cách phá thai khoa học. Nếu phụ nữ lựa chọn bỏ thai bằng thuốc, bác sĩ sẽ giải đáp tỷ lệ thành công, giai đoạn tiến hành cùng với các dấu hiệu có thể diễn ra khi uống thuốc. Nếu mà chấp thuận thực hiện, phụ nữ sẽ được ký cam kết phá thai tự nguyện.
- Dưới khi ký đơn cam kết, phái đẹp được chỉ dẫn khiến một số thăm khám cơ bản quan sát liệu có thỏa điều kiện phá thai hoặc không, nhất là thăm khám máu để xem nhóm máu, có phải nhóm máu thẳng hoặc không, liệu có mắc đông máu hoặc nguy cơ thiếu máu hay không... Nếu như thỏa các điều kiện, chị em phụ nữ sẽ được chỉ định uống thuốc phá thai đúng liệu trình.

Phụ nữ sẽ được dùng thuốc tại căn bệnh viện:

- Liều ban đầu là viên Mifeprestad hàm lượng 200mg liệu có tác dụng khiến thai ngưng phát triển. Nữ được đề nghị để ý tại bệnh viện tầm khoảng 30 phút – 1 giờ đồng hồ. Nếu mà chưa có biểu hiện bất thường, nữ giới sẽ được về nhà cùng với hẹn 2 ngày sau tái phát bệnh viện công lập nhằm dùng liều tiếp theo.
- Liều kế tiếp là Misoprostol hàm số lượng 200mcg liệu có chức năng gây co thắt tử cung cùng với tống thai ra bên ngoài. Dưới khi uống thuốc để ý ở bệnh viện tầm 30 phút – 1 giờ đồng hồ. Nếu chưa có biểu hiện không bình thường, nữ sẽ được về nhà.

Quan sát hiệu quả sau lúc dùng thuốc phá thai như sau:

- Dưới dùng thuốc sẽ ra huyết âm hộ rất nhiều như khi đến chu kỳ kinh nguyệt, Đó là dấu hiệu bỏ thai thành quả. Phái đẹp hoàn toàn an tâm bởi vì khi ra túi thai thì hiện tượng ra huyết sẽ đỡ. Cần phải tái thăm khám nhằm được siêu âm lòng tử cung có sạch hoặc không, khẳng định kết trái phá thai thành công.

## **Tác dụng phụ có khả năng mắc phải sau khi dùng thuốc bỏ thai**

Bác sĩ Khánh Quyên cho thấy, dưới khi bỏ thai bằng thuốc, Nếu như chị em phụ nữ mắc dị ứng đối với những đối tượng của thuốc có thể thấy hiện tượng mọc mề đay, mệt, ngứa... Nếu mà hiện tượng nặng có nguy cơ gây nên khó khăn thở, mắc choáng hoặc mắc phù.

Trong khi sử dụng thuốc có nguy cơ bị phải một số tác dụng phụ như mót nôn, ỉa chảy hay đau đầu, Nếu như chỉ là dấu hiệu thoáng đến thì không nên trị. Nếu mắc cảm giác đau bụng, chị em có khả năng sử dụng thuốc giảm cảm giác đau Paracetamol Nếu mà không bị dị ứng. Nếu như bị ớn lạnh thì nên sử dụng áo ấm, sử dụng nước ấm để giảm bớt triệu chứng.